文章编号: 1674-7054(2019)04-0307-07

烟碱型乙酰胆碱受体 $\beta 4$ 亚基点突变体的构建

张璐, 朱晓鹏, 长孙东亭, 罗素兰

(海南大学海洋学院/热带生物资源教育部重点实验室/海口市海洋药物重点实验室, 海口 570228)

摘要: 利用 PCR 介导的定点突变技术构建包含 $\beta 4$ 亚基的烟碱型乙酰胆碱受体点突变体模型, 同时采用双电极电压钳技术, 对激动剂 ACh 和拮抗剂 α -CTx RegIIA 对突变受体的活性进行检测。结果表明: $\beta 4$ 亚基胞外 N 端序列第 168 位的异亮氨酸 (Ile) 成功突变成了丝氨酸 (Ser), 突变后的受体对激动剂 ACh 的活性降低, 对拮抗剂 α -CTx RegIIA 的活性降低了 1.4 倍, 半阻断剂量 (IC_{50}) 为 $170 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

关键词: 烟碱型乙酰胆碱受体; $\beta 4$ 亚基; PCR 介导的定点突变; 双电极电压钳技术

中图分类号: Q 7

文献标志码: A

DOI: 10.15886/j.cnki.rds wxb.2019.04.001

烟碱型乙酰胆碱受体 (Nicotinic acetylcholine receptors, nAChRs) 是一种由五聚体亚基组成的配体门控离子通道, 可分为神经型 nAChRs 和肌肉型 nAChRs。目前, 研究较多的神经型 nAChRs 的亚型有: $\alpha 3\beta 2$, $\alpha 3\beta 4$, $\alpha 4\beta 2$, $\alpha 6/\alpha 3\beta 2\beta 3$, $\alpha 7$, $\alpha 9\alpha 10$ 等; 肌肉型 nAChRs 有 $\alpha 1\beta 1\delta\gamma$ 和 $\alpha 1\beta 1\delta\epsilon 2$ 类^[1]。神经型 nAChRs 与一系列神经生理和病理过程密切相关^[2]。 β 亚基作为一种重要的辅助型亚基, 与 α 亚基结合, 形成五聚体结构, 协同作用发挥配体门控离子通道的功能。包含 β 亚基的 nAChR 广泛存在于中枢和外周神经系统中, 目前, 已发现多种疾病与 β 亚基的功能相关, 如: 疼痛, 帕金森氏症, 抑郁症, 阿尔茨海默症, 药物成瘾及脑损伤修复等^[3-8]。 β 亚基上氨基酸的变化会造成 nAChRs 功能的变化, 从而导致疾病的发生。有研究发现, 夜间额叶癫痫症就是因为 nAChR 上的 $\beta 2$ 亚基第 287 位的缬氨酸发生了突变, 影响了离子通道的活性, 导致出现癫痫症状^[9]。定点突变技术是目前研究目的蛋白中关键氨基酸的一种常用技术, 利用定点突变技术能定向对关键氨基酸进行突变, 研究目的蛋白中关键氨基酸的作用, 以及发现配体与受体相互作用的关键位点。如: ZHANGSUN D 等^[10] 选择 5 个鼠源 (rat) $\beta 2$ 亚基上的氨基酸位点设计了点突变体, 并选择 α -芋螺毒素 LvIA (α -Conotoxin LvIA, 简称 α -CTx LvIA) 为探针, 检测突变型 nAChR 药理学特性的变化, 研究发现, 胞外 N 端第 59 和 119 位 2 个重要氨基酸位点突变后, 受体对 α -CTx LvIA 的结合活性增强。CUNY H 等^[11] 也利用了定点突变的方式探究 α -CTxs 与 nAChRs 结合的关键氨基酸位点, 结果发现, $\beta 2$ 亚基上胞外 N 端第 59 和 113 位氨基酸改变后, 受体对 α -CTxs 的敏感性会发生改变。 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 亚型是治疗尼古丁依赖、药物滥用、小细胞肺癌、过度饮食和肥胖的潜在靶点^[12-14]。 $\beta 4$ 亚基上的关键氨基酸对 $\beta 4$ 的病理、药理活性具有重要作用, 也是许多配体药物作用的重要靶点。研究 $\beta 4$ 亚基上的关键位点信息, 对于配体药物及先导化合物的研究具有重要意义。有研究表明, $\beta 4$ 亚基上 Loop F 区域的氨基酸位点可以影响受体与激动剂和拮抗剂的结合^[11]。Loop F 中第 168 位的异亮氨酸 (Ile) 是 $\beta 4$ 亚基与 $\beta 2$ 亚基的区分性位点, 体现出 $\beta 4$ 亚基的药理学特性。笔者利用 PCR 介导的定点突变技术, 选择 $\beta 4$ 亚基上胞外 N 端配体结合域 Loop F 中第 168 位的异亮氨酸 (Ile) 进行定点突变, 构建包含 $\beta 4$ 亚基的烟碱型乙酰胆碱受体点突变体模型, 并利用双电极电压钳技术对激动剂 ACh 和拮抗剂 α -CTx RegIIA 对突变受体的活性进行检测

收稿日期: 2019-03-25

修回日期: 2019-04-29

基金项目: 国家自然科学基金项目 (81872794); 海南省研究生创新科研课题 (Hys2017-58)

作者简介: 张璐 (1992-), 女, 海南大学海洋学院 2016 级硕士研究生。E-mail: 460814394@qq.com

通信作者: 罗素兰 (1969-), 女, 教授, 博导。研究方向: 海洋药物与生物技术。E-mail: luosulan2003@163.com

测,旨在为研究 $\beta 4$ 亚基中关键氨基酸的作用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂 大肠杆菌(*E. coli*) DH5 α 感受态细胞由本实验室保存;含有 $\alpha 3$ 、 $\beta 4$ nAChRs亚基基因的质粒获赠于美国犹他大学。乙酰胆碱(ACh)、胶原酶A购自美国Sigma-Aldrich公司;质粒提取试剂盒(OMEGA),PCR突变试剂盒(Quick Change Site-Directed Mutagenesis Kit),cRNA体外转录试剂盒mMES-SAGE mMACHINE Kit,RNA产物回收试剂盒MEGA clear Kit等购自美国ThermoFisher Scientific公司;质粒线性化所需的多种限制性内切酶等购自宝生物(大连)有限公司;ND96生理缓冲液:96 mmol·L⁻¹ NaCl,2 mmol·L⁻¹ KCl,1.8 mmol·L⁻¹ CaCl₂,1 mmol·L⁻¹ MgCl₂,5 mmol·L⁻¹ HEPES,pH7.3~7.7;突变引物的合成和突变体的测序由生工生物工程(上海)股份有限公司完成。实验用雌性非洲爪蟾(*Xenopus laevis*)由美国进口(Nasco)。

1.2 突变体引物的设计 针对鼠源 $\beta 2$ 和 $\beta 4$ 2种亚基在胞外N端配体结合区的氨基酸序列进行对比,选择亚型特异性的差异氨基酸位点作为突变对象。本实验中选择的是鼠源 $\beta 4$ 亚基胞外N端氨基酸序列第168位的异亮氨酸(Ile),将该位点突变成鼠源 $\beta 2$ 亚基对应位置的丝氨酸(Ser),可作为研究2种亚型特异性的1种模型。利用Primer Premier 5.0软件设计突变位点的上下游引物(表1)。

表1 突变位点上下游引物序列

Tab.1 Upstream and downstream primer sequences of mutant sites

突变引物 Mutant primer	碱基序列 Sequence of bases(5'→3')
上游正向引物 FM	GTCGCCCACGGCCAGTATGGATGACTTCAC
下游反向引物 RM	GTGAAGTCATCCATACTGGCCGTGGCGAC

1.3 PCR介导的定点突变 以包含鼠源 $\beta 4$ 亚基序列的质粒为模板,采用PCR介导的定点突变技术对 $\beta 4$ 亚基上第168位氨基酸进行定点突变。包含突变位点的1对引物和模板质粒退火后用高保真聚合酶进行扩增。PCR反应条件为:95℃预变性2 min,95℃变性20 s,60℃退火10 s,延伸阶段68℃3 min,末次循环阶段68℃2 min,共25个循环。正反向引物的延伸产物退火后配对成为不完整的开环质粒。PCR扩增得到的产物用 $w=0.8\%$ 琼脂糖凝胶进行电泳检测,电压为90 V,经过15 min,观察电泳结果。在PCR产物中加1 μ L Dpn I酶,37℃水浴消化质粒模板,Dpn I酶除去模板质粒。开环质粒转入DH5 α 感受态细胞后,选取单克隆,培养后提取质粒。通过测序确定目标位点是否突变正确。

1.4 突变体RNA的制备 大量提取突变正确的突变体质粒,使用限制性内切酶Xho I进行酶切,获得线性化模板。酶切产物纯化后,使用 $w=0.8\%$ 琼脂糖凝胶电泳检测,保留纯度和浓度符合要求的线性化DNA作为体外转录的模板,利用T3体外转录试剂盒进行体外转录。20 μ L反应体系:1~1.5 μ g模板,2 μ L 10 $\times$ Reaction Buffer,10 μ L 2 $\times$ dNTP,1 μ L逆转录酶,37℃,体外转录4 h,获得对应基因的cRNA。此外,为了消除质粒模板的影响,使用DNase酶处理转录产物。cRNA经RNA纯化试剂盒纯化后,利用紫外分光光度计和琼脂糖凝胶电泳,检测cRNA的浓度和纯度,确定是否符合显微注射的要求。

1.5 非洲爪蟾卵母细胞获取和显微注射 麻醉非洲爪蟾1 h后,取出成团卵母细胞,胶原酶酶解后,分离获得单个卵母细胞(图1)。 $\beta 4$ 亚基突变体cRNA和 $\beta 4$ 亚基本体cRNA分别与 $\alpha 3$ 亚基cRNA(1:1)混合,显微注射到爪蟾卵母细胞,注射RNA体积为每个卵母细胞注入59.8 nL RNA。经注射cRNA的卵母细胞在含抗生素的ND96生理缓冲液中,17℃培养2 d后进行电生理活性检测。

图1 卵母细胞酶解分离过程

A: 非洲爪蟾; B: 成团的卵母细胞; C: 显微镜下单个卵母细胞

Fig.1 The process of enzymatic hydrolysis and dissociation of oocytes

A: *Xenopus laevis*; B: Group of oocytes; C: Single oocyte under a microscope

1.6 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 及其突变体的药理活性检测 非洲爪蟾卵母细胞注射 cRNA 2 d 后,置于 50 μL 细胞槽中,室温下,利用双电极电压钳进行检测。卵母细胞的钳制电位为 -70 mV 。用作重力灌注的 ND96 缓冲液流速为 $2\text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 。卵母细胞每分钟给予 $1\text{ s } 100\text{ }\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 刺激,以引起内向电流产生。基线稳定后,停止灌注,在细胞槽中加入 5 μL ND96 生理缓冲液或 5 μL 不同浓度的 α -CTx RegIIA 溶液(从低浓度到高浓度: $10^{-9}, 10^{-8}, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$),静置 5 min 后,开启记录模式,记录不同孵育条件下受体电流的变化。

1.7 数据统计 ND96 溶液孵育非洲爪蟾卵母细胞 5 min 后,以 $100\text{ }\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 刺激 1 s 引发的电流作为基础电流(记录 3 次,取平均值作为标准电流值)。不同浓度 α -CTx RegIIA 孵育卵母细胞 5 min 后,记录 $100\text{ }\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 诱发的电流值作为反应电流值(反应率 = 反应电流值/标准电流值)。根据不同浓度 α -CTx RegIIA 引发的电流反应值,计算它对受体的半数阻断剂量(IC_{50})。剂量反应曲线符合非线性拟合方程:

$$\text{反应率} = 100 / (1 + ([\text{toxin}] / IC_{50})^{nH}),$$

式中, nH 是 Hill 系数, $[\text{toxin}]$ 代表 α -CTx RegIIA 的浓度, IC_{50} 是半阻断浓度。

利用 GraphPad Prism(GraphPad Software, San Diego, CA) 软件进行分析和作图。每个数据点至少包含 3 个以上卵母细胞的统计值。

2 结果与分析

2.1 突变体 PCR 产物电泳图 从图 2 可知,孔道 1(加入的是突变体 PCR 产物) 扩增条带在 5 000 bp 附近,符合目的条带长度,且条带清晰明亮,可用于下一步转化实验。

2.2 突变体质粒测序 突变体质粒的测序结果和 NCBI 比对结果如图 3 所示。 $\beta 4$ 亚基 N 端配体结合区第 168 位密码子 ATC (Ile) 突变为密码子 AGT (Ser), 定点突变准确无误。

2.3 cRNA 制备 从图 4 可知,孔道 1(突变体质粒) 的条带在 3 000 bp 附近,孔道 2(质粒酶切后产物) 的条带在 5 000 bp 附近,孔道 2 条带滞后于孔道 1 条带,说明质粒酶切完全。突变体

图2 定点突变 $\beta 4$ 亚基的 PCR 反应产物琼脂糖凝胶电泳图M: DL 10 000 bp DNA Marker; Lane 1: 突变后 $\beta 4$ [1168S] 亚基 PCR 反应产物Fig.2 Agarose gel electrophoresis of DNA of mutated $\beta 4$ [1168S] subunit by PCR reaction M: DL 10 000 bp DNA Marker; Lane 1: The product of mutated $\beta 4$ [1168S] subunit by PCR reaction

线性模板的质量浓度为 $478.3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, $A_{260/280}$ 比值为 1.84; 经过纯化后, 产物的 $A_{260/280}$ 比值为 1.81, 纯度更好, 质量浓度为 $549.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ (表 2)。线性质粒符合体外转录模板的要求。体外转录收获 $50 \mu\text{L}$ 洗脱产物, 紫外分光光度计测定突变体 cRNA 的质量浓度为 $698.1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, $A_{260/280}$ 比值为 2.12, 符合纯度要求, 可用于卵母细胞注射(表 2)。

图 3 包含定点突变 $\beta 4$ 亚基序列的质粒测序结果和序列比较图

AGT 代表突变后 $\beta 4$ 亚基 168 位氨基酸对应碱基, ATC 代表代表突变前 $\beta 4$ 亚基 168 位氨基酸对应碱基

Fig. 3 Sequencing results and sequence comparison of plasmid containing site-directed mutant $\beta 4$ subunit sequences

AGT represents the base corresponding to the amino acid at position 168 of the $\beta 4$ subunit after mutation, and ATC represents the base corresponding to the amino acid at position 168 of the $\beta 4$ subunit before the mutation

表 2 突变体质粒, 线性 DNA, cRNA 的浓度和 $A_{260/280}$ 比值

Tab. 2 The concentration and ratio of $A_{260/280}$ of mutant plasmid, linear DNA and cRNA

类型 Types	限制性内切酶 Restriction enzyme	启动子 Promoter	质量浓度 / ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$) Concentration	$A_{260/280}$
$\beta 4$ [I168S] 质粒	<i>Xho</i> I	T3	478.3	1.84
$\beta 4$ [I168S] 线性 DNA	<i>Xho</i> I	T3	549.5	1.81
$\beta 4$ [I168S] RNA	<i>Xho</i> I	T3	698.1	2.12

2.4 突变型受体与本体由乙酰胆碱 ACh 激发的电流比较 以相同浓度 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 作用于非洲爪蟾卵母细胞 1 s, 引起了内向电流, 说明 $\alpha 3\beta 4$ 和 $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR 受体模型成功表达。 $\alpha 3\beta 4$ 和 $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR 受体模型的电流大小如图 5 所示, 结果发现, 相同条件下, 本体对 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 激动剂引发的开放电流为 $(690.4 \pm 136.5) \text{ nA}$ ($n = 6$), 突变体对 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 的诱发电流为 $(342.6 \pm 55.64) \text{ nA}$ ($n = 15$), 经比较, 2 种电流差异显著 ($P < 0.05$)。

图 4 包含突变体目的基因质粒和酶切后线性质粒的 $w=0.8\%$ 琼脂糖凝胶电泳图

M: DL 10 000 bp DNA Marker; 孔道 1: 包含突变体 $\beta 4$ [I168S] 亚基目的基因质粒; 孔道 2: 酶切后包含突变体 $\beta 4$ [I168S] 亚基目的基因线性质粒

Fig.4 0.8% agarose gel electrophoresis of plasmid containing mutant sequence and linear DNA after enzyme digestion

M: DL 10 000 bp DNA Marker; Lane 1: The plasmid containing mutated $\beta 4$ [I168S] subunit sequence; Lane 2: linear DNA containing mutated $\beta 4$ [I168S] subunit sequence after enzyme digestion

图 5 本体 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 和突变体 $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR 电流比较
电流是由 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ACh 刺激 1s 激发的, $*=P<0.05$

Fig.5 Comparison of currents between wildtype $\alpha 3\beta 4$ nAChR and mutant $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR

Currents were evoked by 1s pulse ACh ($100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $*=P<0.05$

2.5 突变型受体与本体的药理活性检测

利用拮抗剂 α -CTx RegIIA 对 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 本体和突变体的活性进行研究(图 6), 红色曲线代表本体的剂量反应曲线, 黑色曲线代表突变体的剂量反应曲线, 突变体向右移, 证明受体的活性降低。从表 3 可知, α -CTx RegIIA 对 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 本体 IC_{50} 值为 $120 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$, 而对突变体 $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR 的 IC_{50} 值较本体增大了 1.4 倍, 为 $170 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。证明 168 位发生突变后, α -CTx RegIIA 对 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 的结合活性减弱。

图 6 α -芋螺毒素 RegIIA 对本体和突变体 $\alpha 3\beta 4$ nAChRs 剂量反应曲线

红色虚线代表 $\alpha 3\beta 4$ nAChR, 黑色实线代表突变体 $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR, $\text{mean} \pm \text{SEM}$, $n=3-5$

Fig.6 α -CTx RegIIA dose-response curves for wildtype and mutant $\alpha 3\beta 4$ nAChRs

Red line represents $\alpha 3\beta 4$ nAChR; black line represents $\alpha 3\beta 4$ [I168S] nAChR; $\text{mean} \pm \text{SEM}$, $n=3-5$

表3 α -芋螺毒素 RegIIA 对本体和突变体的半阻断浓度Tab.3 The IC_{50} values for block of wildtype and mutant nAChRs by α -CTx RegIIA

受体类型 nAChR subtypes	半数阻断浓度 $IC_{50}/(\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1})$	比值 Ratio	Hill 系数 Hillslope
$\alpha 3\beta 4$	120	1	0.8
$\alpha 3\beta 4$ [I168S]	170	1.4	1.1

注: 比值 = 突变体 IC_{50} / 本体 IC_{50}

Note: ratio = mutant IC_{50} / wildtype IC_{50}

3 讨论

不同亚型的 nAChRs 是许多疾病及相关新药研发的重要靶点。因此,研究 nAChRs 各种亚型的精细结构对阐明 nAChRs 结构及功能的关系,揭示配体药物与 nAChRs 相互作用的分子机制,以及研究 nAChRs 相关疾病的病理和生理过程至关重要。 $\alpha 3\beta 4$ 是 nAChRs 中重要的 1 种亚型,它广泛分布于外周神经系统和中枢神经系统的内侧缰核、脚间核、后屈束、松果体等组织中,主要参与调节突触间多种神经递质的释放^[15]。吴勇等的研究表明,针对 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 亚型的选择性阻断剂 AT-4001, 18-MC 和 α -CTx AuIB 能够降低大鼠模型的烟碱释放作用^[16];下丘脑中的 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 还参与烟碱介导的食欲降低过程^[17]。此外, $\alpha 3\beta 4$ nAChR 还与许多疾病的药理和生理作用相关,如小细胞肺癌、机械性损伤修复、疼痛、成瘾等。

$\beta 4$ 亚基作为 $\alpha 3\beta 4$ nAChR 中的 1 个关键亚基,不仅参与生理和病理过程的调控,还是许多配体药物作用的重要靶点。但是,目前药物是如何通过 $\beta 4$ 亚基参与神经调控的分子机制尚不清楚,而氨基酸定点突变技术可以确定 $\beta 4$ 亚基上关键氨基酸位点以及阐明药物作用的精细分子机制。有研究表明:突变 $\beta 4$ 亚基 Loop F 上 D191, D192 位天冬氨酸(Asp)会降低受体对激动剂 Epi 和 CCh 的活性,从而说明了在 $\beta 4$ 亚基和激动剂结合作用中,191,192 位点是 $\beta 4$ 亚基上关键氨基酸位点^[18]。本实验利用 PCR 介导的定点突变技术,把位于 $\beta 4$ 亚基中与配体结合关键区域 Loop F 上的第 168 位异亮氨酸(Ile),突变成了 $\beta 2$ 亚基中对应位点的丝氨酸(Ser),该突变体对于研究 $\alpha 3\beta 2$ 和 $\alpha 3\beta 4$ 两种亚型的敏感性差异具有重要意义。Ile 突变成 Ser 后,氨基酸由非极性氨基酸转变成极性氨基酸,疏水性发生了变化,导致该位点形成的口袋结构发生了变化,对激动剂和拮抗剂的活性也随之改变。笔者选取激动剂 ACh 和拮抗剂 α -CTx RegIIA 研究突变体受体的药理学活性,与本体比较,相同浓度 ACh 刺激突变受体激发的电流值比本体减小, α -CTx RegIIA 对突变体活性减弱。该位点在其他激动剂和拮抗剂的结合中是否具有相同影响,还有待进一步研究。

参考文献:

- [1] GOTTI C, CLEMENTI F, FORNARI A, et al. Structural and functional diversity of native brain neuronal nicotinic receptors [J]. *Biochemical Pharmacology*, 2009, 78(7): 703 - 711.
- [2] WONNACOTT S. Presynaptic nicotinic ACh receptors [J]. *Trends in Neurosciences*, 1997, 20(2): 92 - 98.
- [3] COLLO G, CAVALLERI L, ZOLI M, et al. Alpha6-containing nicotinic acetylcholine receptors mediate nicotine-induced structural plasticity in mouse and human iPSC-derived dopaminergic neurons [J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2018(9): 15.
- [4] LIU Q, TANG Z, GAN Y, et al. Genetic deficiency of beta2-containing nicotinic receptors attenuates brain injury in ischemic stroke [J]. *Neuroscience*, 2014, 256: 170 - 177.
- [5] LUO S, AKONDI K B, ZHANGSUN D, et al. Atypical alpha-conotoxin LtIA from *Conus litteratus* targets a novel microsite of the alpha3beta2 nicotinic receptor [J]. *The Journal of Biological Chemistry*, 2010, 285(16): 12355 - 12366.
- [6] NI R Q, MARUTLE A and NORDBERG A. Modulation of alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor and fibrillar amyloid-beta interactions in Alzheimer's disease brain [J]. *Journal of Alzheimers Disease* Jad, 2013, 33(3): 841 - 851.

- [7] SCHULZ K M, ANDRUD K M, BURKE M B, et al. The effects of prenatal stress on alpha4 beta2 and alpha7 hippocampal nicotinic acetylcholine receptor levels in adult offspring [J]. *Developmental Neurobiology*, 2013, 73(11): 806–814.
- [8] STOKER A K, MARKS M J, MARKOU A. Null mutation of the beta2 nicotinic acetylcholine receptor subunit attenuates nicotine withdrawal-induced anhedonia in mice [J]. *European Journal of Pharmacology*, 2015, 753: 146–150.
- [9] FUSCO M D, BECCHETTI A, PATRIGNANI A, et al. The nicotinic receptor $\beta 2$ subunit is mutant in nocturnal frontal lobe epilepsy [J]. *Nature Genetics*, 2000, 26(3): 275–276.
- [10] ZHANGSUN D, ZHU X, WU Y, et al. Key residues in the nicotinic acetylcholine receptor beta2 subunit contribute to alpha-conotoxin Lv1A binding [J]. *Journal of Biological Chemistry*, 2015, 290(15): 9855–9862.
- [11] CUNY H, KOMPELLA S N, TAE H S, et al. Key structural determinants in the agonist binding loops of human beta2 and beta4 nicotinic acetylcholine receptor subunits contribute to alpha3beta4 subtype selectivity of alpha-conotoxins [J]. *Journal of Biological Chemistry*, 2016, 291(45): 23779–23792.
- [12] DAWSON A, MILES M F and DAMAJ M I. The beta2 nicotinic acetylcholine receptor subunit differentially influences ethanol behavioral effects in the mouse [J]. *Alcohol*, 2013, 47(2): 85–94.
- [13] DEZFULI G, KELLAR K J, DRETCHEN K L, et al. Evidence for the role of beta2* nAChR desensitization in regulating body weight in obese mice [J]. *Neuropharmacology*, 2016, 110: 165–174.
- [14] 孙志华, 罗素兰. 烟碱型乙酰胆碱受体及其相关疾病 [J]. *神经药理学报*, 2017, 7(1): 53–64.
- [15] JENSEN A A, FROLUND B, LILJEFORS T, et al. Neuronal nicotinic acetylcholine receptors: structural revelations, target identifications, and therapeutic inspirations [J]. *Journal of medicinal chemistry*, 2005, 48(15): 4705–4745.
- [16] 吴勇, 朱晓鹏, 安婷婷, 等. α -芋螺毒素与烟碱型乙酰胆碱受体作用的药理学 [J]. *热带生物学报*, 2010, 1(1): 78–84.
- [17] YUAN M, MALAGON A M, YASUDA D, et al. The $\alpha 3\beta 4$ nAChR partial agonist AT-1001 attenuates stress-induced reinstatement of nicotine seeking in a rat model of relapse and induces minimal withdrawal in dependent rats [J]. *Behavioural Brain Research*, 2017, 333: 251.
- [18] LINDOVSKY J, KANIAKOVA M, SVOBODOVA L, et al. Role of negatively charged amino acids in beta 4 F-loop in activation and desensitization of alpha 3 beta 4 rat neuronal nicotinic receptors [J]. *Biochimica et biophysica acta*, 2008, 1778(4): 864–871.

Construction of Nicotinic Acetylcholine Receptor $\beta 4$ Subunit Mutant

ZHANG Lu, ZHU Xiaopeng, ZHANGSUN Dongting, LUO Sulan

(College of Marine, Hainan University / Ministry of Education Key Laboratory for Tropical Biological Resources /
Haikou Key Laboratory for Marine Drugs, Haikou, Hainan 570228, China)

Abstract: To explain the molecular mechanisms of interaction between $\beta 4$ nAChR subunit and ligand (agonist ACh and inhibitor α -CTx RegIIA), a mutant of $\beta 4$ nAChR subunit was constructed by substituting 168th Ile (I) with Ser (S) in the Loop F of N-terminal ligand-binding region, by using the method of site-directed mutagenesis that PCR mediated. The results showed that the inward current of oocytes injected with cRNA of $\alpha 3\beta 4$ [S168I] nAChR could be recorded by two-electrode voltage clamp. The mutant receptor had 1.4 times lower sensitivity to α -CTx RegIIA with a higher IC_{50} of $170 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$, compared with the wild-type $\alpha 3\beta 4$ nAChR.

Keywords: nAChR; $\beta 4$ subunit; PCR-mediated site-directed mutagenesis; two-electrode voltage clamp

(责任编辑: 潘学峰)